

Предлагаем Вашему вниманию короткий обзор международных публикаций.

Эффективность биологических препаратов в предотвращении развития пенетрирующей и перианальной форм Болезни Крона (БК). Сравнительный анализ.

Сравнительное когортное исследование, включившее данные 40 693 бионаивных пациентов с БК из базы данных Merative™ (США). Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что ингибиторы ФНО-а более эффективно препятствуют развитию пенетрирующей и перианальной форм БК в сравнении с ведолизумабом и пенетрирующей формы БК в сравнении с устекинумабом у бионаивных пациентов.

McCurdy JD, Stwalley D, Olsen MA, Deepak P. Comparative effectiveness of biologic therapies in preventing penetrating complications in patients with Crohn's disease [published online ahead of print, 2023 Sep 4]. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2023;S1542-3565(23)00664-X. doi:10.1016/j.cgh.2023.08.017

Если Вам необходима дополнительная медицинская информация, пожалуйста, напишите нам по адресу UCBCares.ru@ucb.com

Сравнительный анализ эффективности устекинумаба и ведолизумаба после неэффективности ингибитора ФНО-а у пациентов с БК. Данные регистра ENEIDA

В анализ вошли данные 835 пациентов (207 пациентов получали ведолизумаб и 628 пациентов получали устекинумаб). В условиях реальной клинической практики устекинумаб превосходил ведолизумаб по эффективности и длительности удержания ответа на терапию у пациентов с БК, и неэффективностью предшествующей терапии ингибиторами ФНО-а.

García MJ, Rivero M, Fernández-Clotet A, et al. Comparative Study Of The Effectiveness Of Vedolizumab Versus Ustekinumab After Anti-Tnf Failure In Crohn's Disease (Versus-Cd): Data From Eneida Registry [published online ahead of print, 2023 Jul 31]. *J Crohns Colitis*. 2023;jjad124. doi:10.1093/ecco-jcc/jjad124

Опросник DETAIL – простой и эффективный инструмент для выявления спондилоартрита у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК)

В исследовании оценили эффективность использования опросника DETAIL, включавшего 6 вопросов для выявления пациентов с симптомами спондилоартрита среди пациентов с ВЗК. 333 пациента с ВЗК участвовали в исследовании. На основании ответов в опроснике 67 (23%) пациентов были направлены на консультацию к ревматологу. У 24 (8,2 %) пациентов были впервые выявлены симптомы спондилоартрита. Таким образом опросник является простым и удобным инструментом для выявления суставных симптомов у пациентов с ВЗК.

Keskin O, Farisogullari B, Yardimci GK, et al. The DETAIL questionnaire is a useful and effective tool to assess spondyloarthritis in patients with inflammatory bowel disease. *Front Med (Lausanne)*. 2023;10:1115362. Published 2023 Feb 9. doi:10.3389/fmed.2023.1115362.

Если Вам необходима дополнительная медицинская информация о препарате Симзия® или заболеваниях, при которых применяется этот препарат, пожалуйста, напишите нам по адресу UCBCares.ru@ucb.com